



● 服用回数 1日@回服用してください 処方は@日分
Tome @ vez(es) al día Receta para @ días

vez(ces) al día para días

● 服用時点 cuando tomar





antes de las comidas después de las comidas
食前 食後

entre las comidas antes de dormir
食間 就寝前





あさ  mañana	ひる  medio día	ゆう  noche	ねるまえ  antes de dormir
---	--	--	--





● 1回に服用する量 Cantidad a tomar en 1vez
1回 [@錠・@カプセル・@包]ずつ服用してください

[@ pastilla / @cápsula / @paquete] en una vez

● 剤型 Forma ● 色記号 Colores de señales

 錠剤 pastilla/tableta  W 白 blanco  R 赤 rojo  BL 青色 azul

 カプセル cápsula  Y 黄色 amarillo  O オレンジ naranja  BN 茶色 marrón

 粉薬 medicamento en polvo  P ピンク rosado  G 緑色 verde  SL 銀色 plata

● 薬効 次のような効果があります
Son eficaces para los siguientes

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 熱を下げる antipirético | <input type="checkbox"/> 腹痛止め medicina para dolor de barriga |
| <input type="checkbox"/> 痛みをとめる analgésico | <input type="checkbox"/> 吐き気止め medicamento para nausea |
| <input type="checkbox"/> 抗生物質 antibiótico | <input type="checkbox"/> 下痢止め medicamento antidiarreico |
| <input type="checkbox"/> 消炎剤 disinflamatorios | <input type="checkbox"/> 下剤 laxante |
| <input type="checkbox"/> 抗アレルギー剤(くしゃみ/鼻水) anti alergico(estornudo/liquido nasal) | <input type="checkbox"/> 筋弛緩剤 relajante musculares |
| <input type="checkbox"/> 咳を止める medicina para la tos | <input type="checkbox"/> 抗不安薬 ansiolítico |
| <input type="checkbox"/> 痰をおさえる expectorante | <input type="checkbox"/> 睡眠薬 somnífero |
| <input type="checkbox"/> 気管支拡張剤 broncodilatador | <input type="checkbox"/> 降圧剤 antihipertensivo |
| <input type="checkbox"/> 胃薬 medicina estómacal | <input type="checkbox"/> 血糖降下薬 hipoglucemiante |
| <input type="checkbox"/> 制酸剤 antiácido | |
| <input type="checkbox"/> 必要なとき服用 se toma solo cuando es neccesario | |