

- 服用回数 1日@回服用してください minum obat @ kali setiap
処方は@日分 selama @ hari

setiap kali selama hari

- 服用時点
- | | |
|--|---|
| ☐ 食前
sebelum makan | ☐ 食後
setelah makan |
| ☐ 食間
antara makan | ☐ 就寝前
sebelum tidur |

あさ 	ひる 	ゆう 	ねるまえ 
pagi	siang	malam	sebelum tidur

- 1回に服用する量
1回 [@錠・@カプセル・@包]ずつ服用してください
[@ tablet / @kapsul / @ bungkus] setiap kali minum obat

  				
  				
  				
  				

● 剤型 Form



錠剤
tablet



カプセル
kapsul



粉薬
obat bubuk

● 色記号 sign and color



白
Putih



赤
Merah



青色
Biru



黄色
Kuning



オレンジ
Oranye



茶色
Coklat



ピンク
Merah muda



緑色
Hijau



銀色
Perak

● 薬効

次のような効果があります。
Memiliki efek sebagai berikut

☐ 熱を下げる

obat penurun demam

☐ 腹痛止め

obat nyeri ulu hati

☐ 痛みをとめる

obat penghilang sakit

☐ 吐き気止め

menghentikan mual

☐ 抗生物質

antibiotik

☐ 下痢止め

obat anti diare

☐ 消炎剤

obat anti radang

☐ 下剤

obat sembelit/obat pencabar

☐ 抗アレルギー剤(くしゃみ/鼻水)

Obat anti alergi(Bersin/ Pilek/ Gatal-gatal)

☐ 筋弛緩剤

obat meredakan nyeri otot

☐ 咳を止める

obat batuk

☐ 抗不安薬

obat anti-kecemasan

☐ 痰をおさえる

obat meredakan dahak

☐ 睡眠薬

obat tidur

☐ 気管支拡張剤

obat saluran pernapasan

☐ 降圧剤

obat menurunkan tekanan darah

☐ 胃薬

obat maag

☐ 血糖降下薬

obat menurunkan gula darah

☐ 制酸剤

obat mengurangi asam lambung

☐ 必要なとき服用

Saat penyakitnya berat/症状がひどい時
Saat dibutuhkan/必要な時